

0.7 cm

22.6 cm

0.5 cm

ENVASE: COEX
Etiqueta 500 mL

12 cm

1.8 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es mortal si se ingiere y muy peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en almacén bajo techo, fresco seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

CICOTOX: 08001-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar los ríos, lagos, estanques o arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

CIPERQUIM[®]

250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición química:

Cypermethrin 250 g/L

Aditivos 150 g/L

Solvente Naphtha Ligth Aliphatic c.s.p. 1 L

Reg PQUA N°

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING SAC

Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road,
Song Jiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 500 ml

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CIPERQUIM 250 EC es un insecticida nervioso del grupo de los piretroides. Actúa por contacto e ingestión. Su modo de acción es por modificación de la permeabilidad de los canales de sodio, lo que causa la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, pérdida de función muscular, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS L/Cil.	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25 -0.3	7	0.01
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25 -0.3	21	0.05

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga y sólo cuando se justifique (5% infestación).

Como máximo 2 aplicación/campaña. Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 14 días.

De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

No aplicar en época de floración, por ser tóxico para abejas.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CIPERQUIM 250 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

NOMBRE COMERCIAL		PICTOGRAMA	
NEGRO	C:0 M:0 Y:0 K:100	Banda toxicológica	Pantone Yellow C:0 M:0 Y:100 K:0