

“ LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Fenilurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito, acuda inmediatamente al médico
- En caso contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Si el producto entra en contacto con la piel lavarse con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación: Colocar al paciente en zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial en caso de cese de respiración o dificultad.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000

Opción 4 FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

-Después de usar el contenido o, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Toxico para organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

BRUSH 500 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUPENSION CONCENTRADA-SC

COMPOSICION QUIMICA

Linuron..... 500 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:



FITOCORP SAC

Calle Los Tejedores 187. Vulcano. Ate

Teléfono: 016522182

Formulador:

KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED

UNIT 905 WORKINGBERG COMMERCIAL BUILDING 41-47 MARBLE ROAD,

HONG KONG China

Contenido Neto: 1 L

Lote Nro:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRUSH 500 SC es un herbicida selectivo, sistémico utilizado para el control de malezas (malezas de hoja ancha, gramíneas y algunas malezas perennes) en los cultivos de cebolla, papa y espárragos. Se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)		
	Nombre Común	Nombre Científico					
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	0.5	N.R	0.05		
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>					
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>					
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
	Bejuco	<i>Ipomoea purpurea</i>					
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>					
Setaria	<i>Setaria verticillata</i>						
Papa	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	0.5 - 0.75	N.R	0.05		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>					
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>					
	Pichana	<i>Sida spinosa</i>					
	Espárrago	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			1-1.5	1
Hierba gallinazo		<i>Chenopodium murale</i>					
Pata de gallina		<i>Eleusine indica</i>					

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

N.R. No Relevante

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de BRUSH 500 SC es post-transplante para el cultivo de cebolla, y post-siembra, antes de la rotación en el cultivo de papa. Se recomienda realizar sólo 1 aplicación por campaña. En el Espárrago aplicar después del chapado antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina y oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



