

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# BRUSING 500 SC

## HERBICIDA AGRÍCOLA

SUPENSION CONCENTRADA-SC

### COMPOSICION QUIMICA

Linuron..... 500 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:



### FITOCORP SAC

Calle Los Tejedores 187. Vulcano. Ate  
Teléfono: 016522182

Formulador:

KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED

UNIT 905 WORKINGBERG COMMERCIAL BUILDING 41-47 MARBLE ROAD,  
HONG KONG China  
Contenido Neto: 1 L

Lote Nro:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRUSING 500 SC es un herbicida selectivo, sistémico utilizado para el control de malezas (malezas de hoja ancha, gramíneas y algunas malezas perennes) en los cultivos de cebolla, papa y espárragos. Se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

#### CUADRO DE USOS

Cultivo	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Yuyo Amor seco Chamico Pata de gallina Bejuco Verdolaga Setaria	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Ipomoea purpurea</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.5	N.R	0.05
Papa	Hierba gallinazo Pata de gallina Capulí cimarrón Verdolaga Pichana	<i>Chenopodium murale</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Sida spinosa</i>	0.5 - 0.75	N.R	0.05
Espárrago	Yuyo Hierba gallinazo Pata de gallina	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Eleusine indica</i>	1-1.5	1	7

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

N.R. No Relevante

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de BRUSH 500 SC es post-transplante para el cultivo de cebolla, y post-siembra, antes de la rotación en el cultivo de papa. Se recomienda realizar sólo 1 aplicación por campaña. En el Espárrago aplicar después del chapado antes de la cosecha.

### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina y oxidantes fuertes.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Fenilurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito, acuda inmediatamente al medico
- En caso contacto con la piel: Quitarse la ropa contaminada. Si el producto entra en contacto con la piel lavarse con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación: Colocar al paciente en zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial en caso de cese de respiración o dificultad.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000

Opción 4 FITOCORP SAC: 016522182

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

-Después de usar el contenido o, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado



### MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Toxico para organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



