

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar este producto bñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenilureas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito, acuda inmediatamente al médico
- En caso contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada, lavarse con agua y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación: Colocar al paciente en zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial en caso de cese de respiración o dificultad.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf. : 0800-1-3040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4
FITOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido o enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

V_NURON 500 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUPENSION CONCENTRADA(SC)

COMPOSICION

Linuron..... 500 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1259 - SENASA

Titular del registro:

FITOCORP SAC

Jr. Las Poncianas N° 147. Interior 2B. Urb. La Molina Vieja. La Molina - Lima

Teléfono: 016522182

Formulado por:

KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED

Dirección: Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road

Hong Kong.China

Importador y Distribuidor:



Fecha de Formulación:

N ° Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

V_NURON 500 SC es un herbicida selectivo, sistémico utilizado para el control de malezas (malezas de hoja ancha, gramíneas y algunas malezas perennes) en los cultivos de cebolla, papa y espárragos. Se aplica en pre-emergencia o post-emergencia temprana de las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Cultivo	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>	0.5	N.R	0.05
	“Amor seco”	<i>Bidens pilosa</i>			
	“Chamico”	<i>Datura stramonium</i>			
	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>			
	“Bejuco”	<i>Ipomoea purpurea</i>			
Papa	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	0.5 -0.75	N.R	0.05
	“Setaria”	<i>Setaria verticillata</i>			
	“Hierba gallinazo”	<i>Chenopodium murale</i>			
	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>			
	“Capulí cimarrón”	<i>Nicandra physalodes</i>			
Espárrago	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>	1-1.5	1	7
	“Pichana”	<i>Sida spinosa</i>			
	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>			
	“Hierba gallinazo”	<i>Chenopodium murale</i>			
	“Pata de gallina”	<i>Eleusine indica</i>			

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

N.R. : No Relevante

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Se recomienda realizar sólo 1 aplicación por campaña.
- Por lo general, la etapa apropiada para la aplicación de V_NURON 500 SC es post-transplante para el cultivo de cebolla, y post-siembra, antes de la rotación en el cultivo de papa. En el Espárrago aplicar después del chapodo antes de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina y oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

