

MENTOR®

750 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

Azoxystrobin.....	250 g/kg
Tebuconazole.....	500 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 1263 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: JEMOAGRO S.A.C.
Av. Camino Real N°S/N Panamericana Norte Km. 557
Sector Alto Mochi Trujillo - Peru
ventas@jemoagro.com

FORMULADO POR: Zhejiang Bosst Cropscience Co. Ltd.
N° 1, Fangjiadal Road, Haiyan Economic
Development Zone, Zhejiang Province, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: JEMOAGRO S.A.C.



Contenido Neto: **100 grs**
N° de Lote: **20150805**
Fecha de Formulación: **AGOSTO 2015**
Fecha de Vencimiento: **AGOSTO 2017**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenaar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y semillas.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para preparar alimentos o agua.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilina + triazol.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota del médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTON: 0-800-1-3340-328 7388
ESSALUD: 0801-10200-6411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar los desechos.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MENTOR 750 WG** es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, azoxystrobin (isolemico y transliminil) y tebuconazole (sistémico y de amplio espectro), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar **MENTOR 750 WG** principalmente para el control de manchas foliares.
- **MENTOR 750 WG** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al folaje empleando cualquier equipo convencional (neblinera (mochilas a palanca o motor, siconomas, parhuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE RESINGRO

- Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- **MENTOR 750 WG** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común; sin embargo, es recomendable realizar una previa prueba de compatibilidad. No mezclar con agentes coadyuvantes.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg (cilindro)	Kg / Ha		
CAFÉ	Roya del Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.20	-	7	0.1 Azoxystrobin
						0.05 Tebuconazole
ESPARRAGO	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.30	14	0.01 Azoxystrobin 0.03 Tebuconazole
VID	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.10	0.30	30	0.30 Azoxystrobin 0.31 Tebuconazole
						0.7 Azoxystrobin 0.1 Tebuconazole
MANGO	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.08 - 0.1	-	20	

*P.C.: Período de carencia en días. *LMR: Límite máximo de Residuos

