

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- Antídoto: No existe antídoto específico.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13-040 (línea gratuita)
 BIOAGROCORP TRADING SAC: 348-0009 ESSALUD: 147 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|----------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------|----------------|--------------|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | kg /200 L | kg/Ha | | |
| TOMATE | "Mosca blanca" | <i>Bemisia tabaci</i> | 0.06 | 0.18 | 7 | 0.5 |
| PIMIENTO | "Mosquilla de los brotes" | <i>Prodiplosis longifila</i> | 0.05 | - | 3 | 1.0 |

P.C.: Periodo de Carencia (días)

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: Partes por millón)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **FORTAGE PLUS 700 WP** es un insecticida sistémico con actividad translaminar, que actúa por contacto e ingestión.
- **FORTAGE PLUS 700 WP** es un insecticida de amplio espectro, utilizado para el control de mosca blanca en el cultivo de tomate.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación de **FORTAGE PLUS 700 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.

- Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las primeras 12 horas.

COMPATIBILIDAD

FORTAGE PLUS 700 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina, acida u oxidante.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

FORTAGE PLUS 700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION:

Imidacloprid _____ 700 g/kg
 Aditivos _____ c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1264 -SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.

Importado y Distribuido por:
 BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
 Teléfono: 348-0009

Fecha de Formulación:
 N° Lote :
 Contenido Neto: 100 g.
 Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
 NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD.
 1904, Central International Mansion 105-6
 North Zhongshan Road, Nanjing
 CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

