

30 cm

20 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos químicos: Ditiocarbamatos + Morfolinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 CROP BUSINESS SAC: 369-2669
ESSALUD: 0801-10200

- En caso de ingestión provocar al vómito ó realizar lavado gástrico
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KAYZER es un fungicida es un fungicida sistémico y de contacto, de amplio espectro, que posee acción preventiva y curativa sobre de hongos fitopatógenos como "Mildiu" y "Rancha" o "Hielo".

KAYZER es un fungicida que contiene 2 ingredientes activos en su formulación: mancozeb y dimetomorph los cuales se complementan muy bien en su acción sobre la plaga.

KAYZER es un fungicida de baja toxicidad para los animales de sangre caliente y el hombre.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **KAYZER** cuando las condiciones favorezcan el desarrollo del patógeno (preventivo) o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad (curativo).
Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

KAYZER es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

KAYZER no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	-	14	0.5^1 0.15^2
Papa	"Rancha" o "Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	-	7	0.2^1 0.05^2
Vid	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	-	1.5	66	5^1 3^2

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

¹ Mancozeb

² Dimethomorph



20 cm

30 cm

KAYZER

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Mancozeb 600 g/kg
Dimetomorph 90 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg PQUA N° 1265-SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización

Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

Nº de Lote :

Contenido Neto : 1 Kg.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

Nº 23 Lane 5398, Shenzhuan Road,

Songjiang District - Shanghai

CHINA



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO