

12.7 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo y ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- El producto puede ser letal si es inhalado. No respire las partículas de la aspersión.
- El producto es sensibilizante a la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cloroacetanilida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como debilidad muscular, salivación, temblores, espasmos, náuseas. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

-**ANTÍDOTO:** No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

-**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



HACHAZO
600 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Butachlor 600 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. N° 346-97-AG-SENASA

Titular del Registro, Formulado y Distribuido por:



Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE

**Contenido
Neto: 500 ml**

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HACHAZO 600 EC es un herbicida sistémico, selectivo, con largo efecto residual. Actúa principalmente como herbicida pre-emergente a las malezas en el cultivo de arroz. Controla eficazmente la mayoría de malezas gramíneas, cyperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha, tanto en siembra directa como en transplante.

CONSIDERACIONES PARA EL USO: Aplicar HACHAZO 600 EC, utilizando el envase aplicador, sobre la poza de arroz con una lámina de agua de 5 a 10 cm. Para una buena eficacia del herbicida, el agua de la poza deberá mantenerse retenida y sin circulación por 2 a 3 días. Posteriormente, continuar con la práctica de riego normal. Las aplicaciones deben hacerse en pre-emergencia y, en casos extremos, cuando las malezas tengan no más de 2 hojas verdaderas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: Verter el producto en el envase aplicador y utilizarlo directamente sobre la poza. Abanicar el envase aplicador, asperjando el producto de izquierda a derecha, tratando de alcanzar 3 a 4 metros de distancia por vez, repetir la operación en forma continua, hasta terminar la dosis recomendada.

Nota: Para la presentación de 500 ml utilizar el mismo envase como aplicador.

1.SIEMBRA DIRECTA: Sembrar el arroz sobre el terreno bien mullido y libre de terrones. Luego del riego de germinación y con lámina de agua, aplicar HACHAZO 600 EC sobre el terreno libre de malezas.

2.SIEMBRA POR TRANSPLANTE: Aplicar HACHAZO 600 EC inmediatamente después del transplante, sobre una lámina de agua de 5-10 cm de profundidad, antes de la emergencia de las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	"Artemisa"	<i>Ambrosia peruviana</i>	4 – 5 L/ha	N.A.	N.A.
	"Lechera"	<i>Euphorbia heterophylla</i>			
	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
	"Mazorquilla"	<i>Ischaemum rugosum</i>			
	"Pajilla"	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria geniculata</i>			

L.M.R. = Límite máximo de residuos/P.C. = Período de carencia /N.A. = No aplicable, por no dejar residuos en la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar inmediatamente después de la siembra, y antes de la emergencia del cultivo y las malezas. En casos extremos, se puede aplicar cuando las malezas tengan máximo 2 hojas verdaderas.

PERÍODO DE REINGRESO: 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: A la dosis recomendada no es fitotóxico en el cultivo de arroz.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Producto Peruano



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



22.4 cm

21cm

0.9 CM