

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvos, vapor o aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Neonicotinoide
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-13-040 (línea gratuita)
CROP BUSINESS SAC : 349-2669 ESSALUD: 117 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 L	kg/Ha		
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.06	0.18	7	0.5
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.05	-	3	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carencia

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **COMBATE 700 WP** es un insecticida sistémico con actividad translaminar, que actúa por contacto e ingestión.

- **COMBATE 700 WP** es un insecticida de amplio espectro, utilizado para el control de mosca blanca en el cultivo de tomate.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación de **COMBATE 700 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.

- Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las primeras 12 horas.

FITOTOXICIDAD

- El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

COMBATE 700 WP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 700 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 1272 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto 201 Urb. Mayorazgo IV Etapa - ATE
 Teléfono: 349-2669

F. de Formulación:

N° Lote :

Contenido Neto: 250 g.

F. de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD.

1904, Central International Mansion 105-6

North Zhongshan Road, Nanjing

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

