23.0 ± 0.1 cm

30.0 ± 0.1 cm

4.5 cm

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# GRAVITY®

## 500 WG

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Pyrimethanil ..... 500 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 1275 - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**
**NEOAGRUM S.A.C.**

neoagrum

**Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla**
**Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-3300**

**Contenido neto: 25 kg**

Nº de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

**Formulado por:**
**SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED**
29 Xiaohang Road, Nanjing. China.

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**
**- Grupo Químico: Anilinopyrimidine**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**SAMU: 106** **NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evite el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**GRAVITY® 500 WG** es un fungicida de contacto y sistémico localizado, con acción protectora y curativa.
**GRAVITY® 500 WG** actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial. Es utilizado para el control de diversos hongos fitopatógenos que atacan a la mayoría de cultivos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD: GRAVITY® 500 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y los de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | P.C. | L.M.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | g / 200 L | (días) | (ppm) |
| Alcachofa | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 150 | 7 | 0.01 |
| Arándano | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 150 - 200 | 21 | 5 |
| Cebolla | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 7 | 0.2 |
| Fresa | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 1 | 5 |
| Granado | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 69 | 0.01 |
| Mandarina | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 150 - 200 | 0 | 8 |
| Palto | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 150 - 200 | 72 | 0.05 |
| Papa | Tizón temprano | *Alternaria solani* | 200 - 250 | 7 | 0.05 |
| Pimiento | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 3 | 2 |
| Tomate | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 200 | 1 | 1 |
| Vid | Moho gris o podredumbre gris | *Botrytis cinerea* | 160 | 21 | 10 |

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA