

21,8 cm

12,5 cm

GENERALIDADES

WENTUM® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas de amplio espectro sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium. Actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelial con un prolongado efecto residual.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de **WENTUM® 500 WG** recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

No hacer aplicaciones con alta temperatura ambiental. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. No Aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0,1	-	3	3
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0,15	100	0,05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0,075	-	14	2
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0,2-0,24	0	15
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0,15-0,2	35	0,05
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	-	0,15-0,2	30	0,7

PC: Periodo de Carencia (días) /

LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **WENTUM® 500 WG** (i.a. Azoxystrobin) de 02 a 03 aplicaciones por campaña como máximo en pimiento (2 campañas/año); y 2 aplicaciones por campaña como máximo en espárrago (2 campañas/año), en vid, mandarina, mango y palto (1 campaña/año). Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WENTUM® 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentraciones empleadas.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta y esta hoja informativa.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

WENTUM® 500 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

Composición:

Azoxystrobin 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA N° 961 - SENASA

Titular del registro: Innovaciones y Formulaciones SAC

Importado y distribuido por:

Innovaciones y Formulaciones SAC
Av. Tambo Río Lote 16a Fnd. Chacra Cerro
Comas, Lima-Perú
Tel.: 562-9116 Fax.: 562-9116

**Formulador:**

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **100 g**

F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



12,5 cm

COC(=O)C(=C(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3C#N

- In caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

