

18 cm

12 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ANTAMETHYL® 500 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Kresoxim methyl 500 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg PQUA N° 1156 - SENASA

Titular del registro: Innovaciones y Formulaciones SAC**Importado y distribuido por:****Innovaciones y Formulaciones SAC**

Av. Tambo Rio Lote 16a Fnd. Chacra Cerro

Comas, Lima-Perú

Tel.: 562-9116 Fax.: 562-9116

**Formulador:****Ningbo Sunjoy Agrosience Co. Ltd.**

No.1165 BeiHai Road, Chemicals Industry Zone of Ningbo,
 Zhenhai, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **100 g**

F. de venc:

NO INFLAMABLE**NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO**
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

12 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir, ni aspirar la aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado, lejos de la casa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
- En caso de emergencia llamar a los siguiente teléfonos:

SAMU: 106 / INNOVACIONES Y FORMULACIONES SAC: 562-9116

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase, destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANTAMETHYL® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas que inhibe la respiración mitocondrial del hongo, afectando directamente su metabolismo y su germinación para finalmente causar su muerte.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros síntomas o se presenten condiciones ambientales propicias para el hongo.

No se debe realizar más de dos aplicaciones por campaña / año. El intervalo entre aplicaciones es de 12 a 15 días.

De persistir la enfermedad, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

ANTAMETHYL® 500 WG, es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta y hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	kg/cil.	kg/ha		
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0,060	-	35	1.0
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0,250	3	1.0

PC: Periodo de Carencia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

