12 cm

18 cm

# ANTAMETHYL® 500 WG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**Composición:**
Kresoxim methyl ……. 500 g/kg
Aditivos ……. c.s.p. 1 kg

Reg PQUA N° 1156 - SENASA

Titular del registro: **ANTALIEN SAC**

**Formulador:**
NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

**Importado y distribuido por:**
**ANTALIEN SAC**
Av. Andromeda Mza. I2 Lt. 5 Urb. Matellini - Lima - Lima - Chorrillos
Teléfono: (01) 712-8320

Antalien
Calidad para la Agricultura

F. de form:
N° Lote
Contenido Neto: **100 g**
F. de venc:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

12 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de cuidado. No ingerir, ni aspirar la aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado, lejos de la casa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Estrobilurinas
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**CICOTOX:** 0-800-1-3040 / **ESSALUD:** 117

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido del envase, destrúyalo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**ANTAMETHYL® 500 WG** es un fungicida del grupo de las estrobilurinas que inhibe la respiración mitocondrial del hongo, afectando directamente su metabolismo y su germinación para finalmente causar su muerte.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**
Aplicar cuando se observen los primeros síntomas o se presenten condiciones ambientales propicias para el hongo.
No se debe realizar más de dos aplicaciones por campaña / año. El intervalo entre aplicaciones es de 12 a 15 días.
De persistir la enfermedad, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al área tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**
**ANTAMETHYL® 500 WG,** es compatible con la mayoria de productos fitosanitarios.

**FITOTOXICIDAD**
No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta y hoja informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre científico | kg/cil. | kg/ha | | |
| Vid | Oídium | *Erysiphe necator* | 0,060 | - | 35 | 1.0 |
| Pimiento | Oídium | *Leveillula taurica* | - | 0,250 | 3 | 1.0 |

**PC:** Periodo de Carencia (días) / **LMR:** Límites Máximos de Residuos (ppm)