

Titular del Registro: 

ARIPARI®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Grupo Químico: Chloronitrile+Cyanoacetamide oxime

Polvo Mojable–WP

Reg. PQUA N°

Nombre Común:

- Chlorothalonil.....720 g/kg
- Cymoxanil.....80 g/kg

Nombre IUPAC:


- Chlorothalonil: 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile
- Cymoxanil: 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

Formula Estructural:

- Chlorothalonil:



- Cymoxanil:



Formula Empírica:

- Chlorothalonil: C₆Cl₄N₂
- Cymoxanil: C₇H₁₀N₄O₃

Peso Molecular:

- Chlorothalonil: 265,91
- Cymoxanil: 198,2 g/mol

Capacidad y clase de los envases: 1 kg, 500 g, 200 g (bolsa)

Formulado y distribuido por:

Serfi SA

Av. Oscar R. Benavides (ex diagonal) 380Of. 701. Miraflores Lima-PERÚ. Teléfono: 51(1)446-2896

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto. Posible cancerígeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Chloronitrile + Cyanoacetamide oxime
- En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, si la persona está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- **Nota al Médico**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0-800-1-3040 (GRATUITO)
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 Opción 4 (GRATUITO)
CISPROQUIM.: 0800-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARIPARI, es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.

Preparación y aplicación

ARIPARI, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Agente Causal	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			kg/200 L	kg/ha		
Ajo	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 ¹ 0,05 ²
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 ¹ 0,05 ²
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0	7	0,02 ¹ 0,05 ²

PC: Periodo de Carenacia LMR.: Límite Máximo de Residuos
¹Chlorothalonil ²Cymoxanil

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones medio ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Realizar máximo una aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 48 horas

COMPATIBILIDAD: ARIPARI es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.