

ARIPARI®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición garantizada:

Chlorothalonil.....	720 g/kg
Cymoxanil.....	80 g/kg
Aditivos.....	csp 1 kg

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulado y Distribuido por:



Av. Oscar R. Benavides (ex diagonal) 380 Of. 701. Miraflores.

Teléfono: 51 (1) 446-2896

LIMA - PERÚ

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1 kg
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Tóxico por inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto. Posible cancerígeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Chloronitrile + Cyanoacetamide oxime

- En caso de inhalación retirar a la persona afectada al aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, si la persona está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- Nota al médico**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático
- En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 0-800-1-3040 (GRATUITO)
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 Opción 4 (GRATUITO)
CISPROQUIM: 0800-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga	Agente Causal	Dosis		PC (dias)	LMR (ppm)
			kg/200 L	kg/ha		
Ajo	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0,5	1,0	7	0,5 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0	7	0,02 (chlorothalonil) 0,05 (cymoxanil)

PC: Periodo de Carenia; LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Aripari** es un fungicida preventivo y curativo usado en pulverizaciones foliares para el control de los hongos que atacan a los cultivos indicados en el cuadro de usos y dosis.
- **Preparación y Aplicación:** **Aripari** se prepara diluyendo la dosis la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Realizar máximo una aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

- 48 horas.

COMPATIBILIDAD

- **Aripari** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

- No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

