

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No aspirar las gotitas de aspersión durante la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Triazoles + Imidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración es dificultosa darle oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la zona expuesta con jabón suave y agua, a continuación enjuague con agua tibia. Acuda a un médico inmediatamente.
- Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX: 0800-1-3040; INFOSALUD 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Zamir®

400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 133 g/L
 Prochloraz 267 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1287- SENASA

Titular de registro,
 Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of 503.
 Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
 Calle 1C N° 7-53 Int
 Zona Franca Barranquilla, Colombia.



ADAMA

Contenido Neto: 1 Litro

Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Zamir 400 EW es un fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante de buen efecto residual que inhibe la síntesis de ergosterol de los hongos. Aplicar dirigido al follaje o parte aérea con equipo de pulverización terrestre. Se recomienda realizar la aplicación de forma preventiva o en estadios iniciales de la enfermedad, con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar que el rocío se seque para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/ha)		
Arroz	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.40-0.45	-	35	1.5'/1.0 ²
Cebolla	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	-	0.6 - 0.7	21	0.1'/0.05 ²
Mandarina	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.3	-	20	5'/10 ²
Palto	Muerte regresiva (<i>Lasiodiplodia theobromae</i>)	0.15-0.2	1.35 - 1.8	80	0.02'/5 ²
	Cladosporium (<i>Cladosporium herbarum</i>)	0.15	1.35		

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos 1-tebuconazole/2-prochloraz

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña y cultivo, considerar una (01) campaña al año.

Momento de aplicación

Arroz.- Desde punto de algodón (antes de la emergencia de la panícula).
 Cebolla.- Desde desarrollo vegetativo hasta llenado de bulbo. Por lo general, B. cinerea se presenta a partir de los 40 días después del trasplante. Dejar como mínimo un intervalo de 7 días entre aplicaciones.
 Mandarina.- Entre floración hasta cuajado de frutos. Dejar como mínimo un intervalo de 15 días entre aplicaciones.
 Palto/Muerte regresiva.- Entre la poda y floración. Dejar un intervalo de 30 días entre aplicaciones.
 Palto/Cladosporium.- Durante la floración. Dejar un intervalo de 30 días entre aplicaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 288 mm x 140 mm
 Esta etiqueta requiere Hoja Informativa