

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No aspirar las gotitas de aspersión durante la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles + Imidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración es dificultosa darle oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la zona expuesta con jabón suave y agua, a continuación enjuague con agua tibia. Acuda a un médico inmediatamente.
- Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de complementaria.

• **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX 0800-1-3040; INFOSALUD 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Zamir®

400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 133 g/L
Prochloraz 267 g/L
Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1287- SENASA

Titular de registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N°7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia

Contenido netos: **20 Litros**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Zamir 400 EW es un fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante que actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol en los hongos mediante la combinación de sus dos ingredientes activos: tebuconazole y prochloraz. El tebuconazole al trasladarse de forma acropétala (hacia arriba) en las plantas protege los nuevos brotes, mientras que el prochloraz por su acción de contacto y traslaminar protege la superficie y capa superior de las hojas. Aplicar dirigido al follaje con equipo de pulverización terrestre, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o de forma preventiva cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de los mismos. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)	(L/ha)		
Arroz	Pudrición de la vaina (<i>Sarocladium oryzae</i>)	0.40-0.45	-	35	1.5 ¹ /1.0 ²
Cebolla	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	-	0.6 - 0.7	21	0.1 ¹ /0.05 ²
Mandarina	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.3	-	20	5 ¹ /10 ²
Palto	Muerte regresiva (<i>Lasiodiplodia theobromae</i>)	0.15-0.2	1.35 - 1.8	80	0.02 ¹ /5 ²
	Cladosporium (<i>Cladosporium herbarum</i>)	0.15	1.35		

P.C.: Periodo de Carenacia LMR : Límite Máximo de Residuos 1-tebuconazole/2-prochloraz

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña y cultivo, considerar una (01) campaña al año.

Momento de aplicación

Arroz.- Desde punto de algodón (antes de la emergencia de la panícula).
Cebolla.- Desde desarrollo vegetativo hasta llenado de bulbo. Por lo general, B. cinerea se presenta a partir de los 40 días después del trasplante. Dejar como mínimo un intervalo de 7 días entre aplicaciones.
Mandarina.- Entre floración hasta cuajado de frutos. Dejar como mínimo un intervalo de 15 días entre aplicaciones.
Palto/Muerte regresiva .- Entre la poda y floración. Dejar un intervalo de 30 días entre aplicaciones.
Palto/Cladosporium.- Durante la floración, dejar 30 días entre aplicaciones.

PERIODO DE INGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 330 mm x 200 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa