"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No aspirar las gotitas de aspersión durante la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles + Imidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Lávese la boca con abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Acuda a un médico.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco, mantener al paciente recostado y abrigado. Si la respiración es dificultosa darle oxígeno. Si no hay respiración, realizar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. Consulte con un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar la zona expuesta con jabón suave y agua, a continuación enjuague con agua tibia. Acuda a un médico inmediatamente.
- Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
  SAMU 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por La autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Zamir® 400 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

Composición:

Tebuconazole ..... 133 g/L
Prochloraz ..... 267 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1287- SENASA

Titular de registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N°7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia

Contenido neto: **20 Litros**
N° de lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

ADAMA

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Zamir 400 EW es un fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante de buen efecto residual, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de ergosterol en los hongos. El tebuconazole al traslocarse de forma acropétala (hacia arriba) en las plantas protege los nuevos brotes, mientras que el prochloraz por su acción de contacto y traslaminar protege la superficie y capa superior de las hojas. Para mayor información ver hoja informativa adjunta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Arroz	Pudrición de la vaina (*Sarocladium oryzae*)	0.40-0.45	-	35	1.5[1]/1.0[2]
Cebolla	Pudrición gris (*Botrytis cinerea*)	-	0.6 - 0.7	21	0.15[1]/0.05[2]
Mandarina	Pudrición gris (*Botrytis cinerea*)	0.3	-	20	5[1]/10[2]
Palto	Muerte regresiva (*Lasiodiplodia theobromae*)	0.15-0.2	1.35 - 1.8	80	0.02[1]/5[2]
	Cladosporium (*Cladosporium herbarum*)	0.15	1.35		
Vid	Muerte regresiva (*Lasiodiplodia theobromae*)	0.2	-	61	6[1]/0.03[2]

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos 1-tebuconazole / 2-prochloraz

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña al año para los cultivos de arroz, cebolla, mandarina y palto, mientras que para vid, se debe considerar una (1) aplicación por campaña/año.

Momento de aplicación

Arroz.- Desde punto de algodón (antes de la emergencia de la panícula).
Cebolla .- Desde desarrollo vegetativo hasta llenado de bulbo. Por lo general, *B. cinerea* se presenta a partir de los 40 días después del trasplante. Dejar como mínimo un intervalo de 7 días entre aplicaciones.
Mandarina .- Entre floración hasta cuajado de frutos. Dejar como mínimo un intervalo de 15 días entre aplicaciones.
Palto/Muerte regresiva .- Entre la poda y floración. Dejar un intervalo de 30 días entre aplicaciones.
Palto/Cladosporium.- Durante la floración. Dejar un intervalo de 30 días entre aplicaciones.
Vid.- En la etapa de brotamiento o crecimiento de ramas.

PERIODO DE INGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones: 330 mm x 200 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa