

“ LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación. Usar equipos de protección
- Ligeramente irritante a la piel. Evitar la exposición directa.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Guardar bajo llave este producto en lugares frescos y con buena ventilación.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Pyrimidinylthiobenzoates
- En caso de intoxicación por ingestión, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Mover al afectado al aire libre.
- Nota al médico, no tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4, Agro Klinge S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
 - Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Este producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

SPEDATEC®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION

Bispyribac Sodium..... 400 g/l
Aditivos..... c.s.p 1L

Registro PQUA N°1289- SENASA

Titular del Registro, Formulador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telef.: 612-6565, RUC N°: 20508704217

Formulador:

BETA CHEMICALS

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center,
No. 116 Zizhuyuan Road, Beijing 100097, China

Contenido Neto 1 L

Lote Nro:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPEDATEC es un herbicida postemergente de acción sistémica, con actividad a nivel foliar y radicular, inhibe la acción de la acetato lactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada, por lo que inhibe el crecimiento y división celular, causando clorosis, necrosis y muerte de la maleza.

SPEDATEC se recomienda para el control de malezas en el cultivo del arroz; para un buen control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha. Aplicar sobre arroz de transplante y en siembra directa en suelo húmedo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Arroz	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	0.15 -0.20	0.15 - 0.20	30	0.2
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>				
	Pata de gallo	<i>Eleusine indica</i>				
	verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 - 20 días rotándolo con grupos químicos diferentes dentro de un programa. Al año se recomienda una máximo de 4 aplicaciones por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

No se ha reportado incompatibilidad con otros plaguicidas. Realizar pruebas de compatibilidad. Evitar mezclar con sustancias extremadamente ácidas, básicas o agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis aprobadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

