

25.3 cm

9 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es nocivo por ingestión. Existe el riesgo de absorción a través de la piel. Es irritante para la piel.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Piretroide
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - No se ha determinado antídoto específico.
 - Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 117 ó 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50847 / POINT ANDINA S.A.: (01) 348-1018 / 349-9609

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces u otros organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Xquisito[®]
50 CE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

COMPOSICIÓN:

Lambda-cyhalothrin.....50 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 674 - SENASA

Titular del Registro:



POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima - Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China
Teléfono (86-510) 8785 1001
Fax 8785 1537

Importado y distribuido por:



DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N°991, piso 9
Magdalena del Mar. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 501-1000

Contenido Neto: **0.5 L**
N° de Lote:
Fecha de Formulación
Fecha de vencimiento:
NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

XQUISITO 50 CE es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. Produce el bloqueo en la conducción de los estímulos nerviosos principalmente por modificar la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas a los iones de sodio. Es muy activo en bajas dosis brindando resultados excelentes sobre una amplia gama de insectos, especialmente larvas de lepidópteros. También tiene actividad ovicida y adulticida.

Por su efecto sistémico **XQUISITO 50 CE** está destinado para el control de plagas como *Spodoptera frugiperda* en los cultivos de maíz.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una emulsión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	mL/ha*	mL/cil		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	300	150	7	0.02

*En base a un volumen de 400 litros de agua.
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).
P.C.: Período de Carencia en días.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan 2 aplicaciones por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Debido a su especificidad se recomienda hacer una pre mezcla previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario.

FITOTOXICIDAD:

XQUISITO 50 EC no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MARCA XQUISITO 50 CE
PANTONE WARM RED C

LOGO POINT ANDINA S.A.
PANTONE 356 C

LOGO DROKASA
PANTONE RED 032 C

BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE YELLOW C