“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

TALUM® 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:
Fosetyl aluminium.....800 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar el equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado, cerrado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Fosfonatos
- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar al paciente con agua, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarlo con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar al:
  CICOTOX Telf.: 0800-1-3040, 328-7700
  ESSALUD: 411-8000 Anexo 4, Infosalud: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
TALUM® 80 WP, es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de la planta, con ambos tipos de translocación acropétala y basipétala.

Para la preparación, vierta la cantidad de **TALUM® 80 WP**, en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/cil	Kg/Ha		
Mandarino	Marchitez	*Phytophthora nicotianae*	0.75	-	30	75
Palto	Tristeza del palto	*Phytophthora cinnamomi*	0.5-0.75	3.0-3.75	15	50
Pimiento	Azul o hielo	*Phytophthora capsici*	0.7	-	15	130
Vid	Mildiú	*Plasmopara viticola*	0.5-0.6	-	21	60

L.M.R.: Límite máximo de residuos **P.C.:** Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar **TALUM® 80 WP** cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación. En caso se requiera una tercera aplicación usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al área tratada antes de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a las dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

PQUA N°1303 - SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú

Arysta LifeScience
Innovation. Agility. Results.

Formulado por:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble road.
Hong Kong, China

Importado y distribuido por:
Silvestre International Company S.A.C.
Calle Virrey Manuel Amat y Juniet 502
Dpto. 101 - Urb. La Virreyna
Santiago de Surco - Lima - Perú
Telf: 01-3634668

SICSAC

® Marca Registrada

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **1 kg**
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ET PQUA N°1303-SENASAV003-01