

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuada y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
- Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua.
- Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas en caso de alergia en personas susceptibles.

Teléf. Emergencia:

SAMU: 106

Teléf. del titular:

L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC: (051-01) 382 - 4874

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BIOFARM

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de gobernadora (*Larrea tridentata*) 95 %

Aditivos c.s.p. 100 %

Reg. PBUA N° 351 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC

Avenida Javier Prado Este 488. Piso 7

San Isidro. Lima, Perú

Teléfono: (051-01) 382 - 4874

FORMULADOR:

ULTRAQUÍMICA AGRÍCOLA S.A. DE C.V.

Calle 56 Sur N° 7A (Esq. Andador 11)

Col. CIVAG C.P. 62500. Jiutepec, Mor.

México.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRILAND S.A.C

Calle de Los Ingenieros Mz G Lt 1 Dpto 503

Residencial Ingenieros - Santiago de Surco

Lima - Perú

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **200 L**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **BIOFARM** es un extracto vegetal derivado de la gobernadora (*Larrea tridentata*) con acción fungicida y bactericida. Sus resinas y ácidos orgánicos inhiben la germinación de esporas y el crecimiento de hongos y bacterias.
- **BIOFARM** para saber cada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 6.5 para una mejor acción del producto.
- Vierta la cantidad necesaria de **BIOFARM** directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Agite y aplique.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil de 200L	L/ha		
Papa	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	0.75 - 1.00	-	N.A	N.A
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.75 - 1.00	3.0 - 4.0	N.A	N.A
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.50 - 0.75	-	N.A	N.A
Paprika	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.75 - 1.00	-	N.A	N.A
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.7	-	N.A	N.A
Café	Roya del Cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	2.0 - 3.0	-	N.A	N.A
Cacao	Moniliasis del Cacao	<i>Monilophthora roreri</i>	-	3.0 - 4.0	N.A	N.A
Arándano	Roya del Arándano	<i>Naohidemycos vaccinii</i>	1.0 - 2.0	-	N.A	N.A

PC: Período de Carencia.

NA: No Aplica.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

BIOFARM se recomienda realizar las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, asegurándose que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. **BIOFARM** puede aplicarse durante todo el ciclo de cultivo, en floración, durante la polinización, fructificación y cortes.

En Vid, se recomienda aplicar desde desarrollo vegetativo a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

Para el cultivo de Café, se debe aplicar en desarrollo vegetativo cuando se observen los primeros síntomas, se recomienda realizar 2 aplicaciones por año. La aplicación se puede realizar con una mochila manual o motor. El rango de gasto de agua para el cultivo de Café es de 400 - 700 L/ha.

Para el cultivo de Cacao, se debe aplicar al inicio de la fructificación cuando se observen los primeros síntomas, se recomienda realizar 2 aplicaciones por año. La aplicación se puede realizar con una mochila manual o motor. El rango de gasto de agua para el cultivo de Cacao es de 400 - 600 L/ha.

Para el cultivo de Arándano, se recomienda realizar 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días. El rango de gasto de agua para el cultivo de Arándano es de 300 - 600 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con peróxido de hidrógeno, zinc y con productos que no modifiquen el rango de pH 6 a 6.5. Incompatible con hidróxido de sodio. Para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No se observa efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico química del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

