

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

SAMU: 106

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C: 944 434 257

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Fecha de Formulación:  
Lote N°:  
Contenido Neto: 250ml  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

Reg. PQUA N° 1336 - SENASA  
Titular del Registro: CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C

Importado y Distribuido por:  
CONSORCIO OMNICROP S.A.C

**omnicrop**

Una agricultura diferente

Mza. R lote. 7 urb. Natasha Alta - La Libertad - Trujillo - Trujillo  
RUC: 20559660796

Formulado por:  
JIANGSU HEYE AGROCHEMICAL CO., LTD  
Linhai Industrial Park Area, Sheyang County,  
Yancheng, Jiangsu Province  
CHINA

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**CLORFENAKYLL**  
**240 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Chlorfenapyr ..... 240 g/L

Aditivos.....c.s.p 1L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CLORFENAKYLL 240 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad translinar y es un inhibidor de la fosforilación oxidativa causa disrupción de la producción de ATP, muerte celular, y ultimadamente muerte de la plaga.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVOS | PLAGA            |                              | DOSIS<br>L/200 L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común     | Nombre Técnico               |                  |                |                 |
| Maíz     | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.15             | 12             | 0.05            |
| Tomate   | Polilla          | <i>Tuta absoluta</i>         | 0.15 - 0.2       | 7              | 0.05            |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Limite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.  
Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.  
Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

