

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 500 mL- Versión B-Formulado en la Perú

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto causa irritación moderada a los ojos, evite contacto con la piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phenylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No dejar solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo y dar de beber mucha agua (no leche, no alcohol, no aceite) y una suspensión de carbón medicinal.
- No dar de beber, ni inducir el vómito a un paciente se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

- Teléfonos de emergencia:** EsSalud: 117, CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita) ó 328 7398. Telef. Farmex S.A. (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase, luego llevar el envase al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas, semiacuáticas y plantas no objetivo.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso con los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe utilizarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención del THIDIAZURON, a fin de reducir la movilidad y minimizar la lixiviación hacia aguas subterráneas.

ZEROFOL 40% SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición:

Thidiazuron 400 g/L
Aditivos c.s.p... 1.0 L

Reg. N°

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Fabricado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
N°23, Lane 5398, shenxhuan road,
Song Jiang District, Shanghai, China.
Teléfono: +86-21-51698968
Fax: +86-2464138597



Formulado y distribuido por:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima. Teléfono: 630-6400.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

CONTENIDO NETO: 500 mL

Fecha de Vencimiento:

**NO
CORROSIVO**

NO INFLAMABLE

**NO
EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ZEROFOL 40% SC es un regulador agrícola cuyo ingrediente activo es el thidiazuron se utiliza como defoliante agrícola en el cultivo de algodón. La acción del ZEROFOL 40% SC produce una defoliación rápida y eficiente. Su uso facilita realizar una cosecha mecanizada más rápida, fácil y limpia.

Sistema de preparación y aplicación:

ZEROFOL 40%SC se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	L/ 200 L	L/Ha		
Algodón	0.25	0.375	5	0.3

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN. Aplicar cuando las capsulas de algodón presenta el 70-80% de apertura. Realizar solo una aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con plaguicidas y abonos foliares.

Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. ZEROFOL 40% SC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
- CUIDADO -**

