

ENVASE: COEX
Etiqueta 1Litro

28.5 cm

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado no ingerir
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
 - Usar ropa protectora durante el transporte y aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 horas siguientes a la aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pirroles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia por 15 a 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Si usa lentes de contacto, retírales suavemente. Continuar con el lavado.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar las zonas afectadas cuidadosamente durante 20 minutos.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental, colocar a la persona en un lado con aire fresco y monitorizar que no exista dificultad respiratoria.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 117 (gratuito)
CISPROQUIM: 0800-50-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y verta la mezcla en la mezcla de aplicación y luego indíquelo destruido o perforado y deseche en un lugar seguro.
- Derivela el envase lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros entomofitos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar las aguas superficiales con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el saco destinado por las autoridades locales para este fin.



TORMENTA

240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Chlorfenvapyr 240 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. POUA N° 1330 - SENASA

Tiular del Registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.

Importado y distribuido por:

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.



Av. Marco Cápac N° 847 Carmen de la Legua - Reynoso - Callao
Teléfono: 452-4112

Formulado por
JIANGSU HEYE AGROCHEMICAL CO., LTD
Linha Industrial Park Area, Sheyang County,
Yangcheng, Jiangsu Province
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



NOMBRE COMERCIAL
NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA
Banda toxicológica Pantone Yellow
C:0 M:0 Y:100 K:0

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TORMENTA 240 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad translocatoria y es un inhibidor de la fosforilación oxidativa causando disrupción de la producción de ATP, muerte celular, y ultimadamente muerte de la plaga.

La preparación de la mezcla de aplicación se realiza diluyendo la dosis recomendada de TORMENTA 240 SC en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15	12	0.05
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	0.15-0.2	7	0.05

P.C.: Período de curación

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la infestación plaga-cultivo.

El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TORMENTA 240 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: TORMENTA 240 SC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



15 cm

2.2 cm

9