

# Lannate® 40 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Polvo Soluble (SP)

**Composición química:**

Methomyl..... 400 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1340 - SENASA

**Titular del registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.**  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulado por:  
**DuPont de Colombia S. A.**  
Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 14  
Teléfono: 2595900  
Bogotá D.C. Colombia

Importado y Distribuido por:  
**FARMEX S.A.**  
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27- PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400  
Fax: (01) 630-6410  
www.farmex.com.pe



Fecha de formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: 135 g  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** • Este producto es dañino, no ingerir. • Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión). • Causa irritación moderada a los ojos. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas, después de la aplicación. • Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Manténgase alejado del fuego y las chispas.

**Información para el médico:** El envenenamiento con metomil produce efectos asociados con la actividad de la anticolinesterasa, como: debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, malestar en el pecho, constricción de la pupila, sudoración, pulso débil y temblores de los músculos. Antídoto: Tratamiento: Utilice sulfato de atropina para el tratamiento. Administre dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg, vía intravenosa, cada 10 a 30 minutos hasta alcanzar una atropinización completa. Mantenga la atropinización hasta que el paciente se recupere. La respiración artificial u oxígeno pueden ser necesarios. No permita la exposición a inhibidores de la anticolinesterasa hasta asegurar la recuperación. No utilice 2-PAM para exposiciones con **Lannate® 40 SP** únicamente. Sin embargo, para exposiciones combinadas de **Lannate® 40 SP** con insecticidas organofosforados, el 2-PAM puede ser utilizado como suplemento al tratamiento con sulfato de atropina, descrito anteriormente. No utilice morfina.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPROSQUIM: 080-050-847 Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

™ © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

