

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Lannate® 40 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición:

Methomyl 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1340 - SENASA

Titular del registro: ClabeRep de Perú S.A.C.
Cajamarca 123, P3. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina

Formulado por:



CORTEVA™
agriscience

DuPont de Colombia S.A.
Calle 113 No. 7-21 Torre A, Oficina 1401
Tel: (601) 259 5900
Bogotá D.C. - Colombia

Importado y Distribuido por:



Farmex

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400. Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

FECHA DE FORMULACIÓN:

N° DE LOTE:

CONTENIDO NETO: 135 g

FECHA DE VENCIMIENTO:



™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

185 mm

110 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: •Este producto es dañino, no ingerir. •Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión). •Causa irritación moderada a los ojos. •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. •Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. •Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas, después de la aplicación. • Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. •Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. •Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. •Manténgase alejado del fuego y las chispas.

Información para el médico: El envenenamiento con metomil produce efectos asociados con la actividad de la anticolinesterasa, como: debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, malestar en el pecho, constricción de la pupila, sudoración, pulso débil y temblores de los músculos. Antídoto: Tratamiento: Utilice sulfato de atropina para el tratamiento. Administre dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg, vía intravenosa, cada 10 a 30 minutos hasta alcanzar una atropinización completa. Mantenga la atropinización hasta que el paciente se recupere. La respiración artificial u oxígeno pueden ser necesarios. No permita la exposición a inhibidores de la anticolinesterasa hasta asegurar la recuperación. No utilice 2-PAM para exposiciones con **Lannate® 40 SP** únicamente. Sin embargo, para exposiciones combinadas de **Lannate® 40 SP** con insecticidas organofosforados, el 2-PAM puede ser utilizado como suplemento al tratamiento con sulfato de atropina, descrito anteriormente. No utilice morfina.

En caso de EMERGENCIA llamar a 106 SAMU: 106, CLABREP DE PERÚ S.A.C. 964666605

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Lannate® 40 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición:

Methomyl 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1340 - SENASA

Titular del registro: ClabeRep de Perú S.A.C
Cajamarca 123, P3. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina

Formulado por:



DuPont Indonesia Pasuruan Plant
Jalan Rembang Industri 1/48A-B PT. Pier
Industry Estate, Pasuran City, East Jawa, 67153,
Indonesia

Importado y Distribuido por:



FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400. Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

FECHA DE FORMULACIÓN:

N° DE LOTE:

CONTENIDO NETO: 135 g

FECHA DE VENCIMIENTO:



™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

185 mm

110 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: •Este producto es dañino, no ingerir. •Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión). •Causa irritación moderada a los ojos. •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. •Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. •Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas, después de la aplicación. •Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados. •No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. •Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. •Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. •Manténgase alejado del fuego y las chispas.

Información para el médico: El envenenamiento con metomil produce efectos asociados con la actividad de la anticolinesterasa, como: debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, malestar en el pecho, constricción de la pupila, sudoración, pulso débil y temblores de los músculos. Antídoto: Tratamiento: Utilice sulfato de atropina para el tratamiento. Administre dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg, vía intravenosa, cada 10 a 30 minutos hasta alcanzar una atropinización completa. Mantenga la atropinización hasta que el paciente se recupere. La respiración artificial u oxígeno pueden ser necesarios. No permita la exposición a inhibidores de la anticolinesterasa hasta asegurar la recuperación. No utilice 2-PAM para exposiciones con **Lannate® 40 SP** únicamente. Sin embargo, para exposiciones combinadas de **Lannate® 40 SP** con insecticidas organofosforados, el 2-PAM puede ser utilizado como suplemento al tratamiento con sulfato de atropina, descrito anteriormente. No utilice morfina.

En caso de EMERGENCIA llamar a 106 SAMU: 106, CLABREP DE PERÚ S.A.C. 964666605

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

