Lannate® 40 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición Química:

Methomyl		**400 g/kg**
Aditivos	c.s.p.	**1 kilo**

PQUA N° 1340 - SENASA

Titular del Registro: DuPont Perú S.A.C.
Av. República de Panamá 3531,Of. 1203 - Lima 27
Lima-Perú

Formulado por:
DuPont de Colombia S. A.
Calle 113 No.7-21 Torre A Piso 14
Teléfono: 629 22 02
Bogotá D.C.- Colombia

Importado y Distribuido por:
FARMEX
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERU
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 135 g

No. Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

®Marca Registrada de E.I. du P ont de Nemours and Company

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

UTILICE ROPA PROTECTORA DURANTE EL MANIPULEO Y APLICACIÓN (USE GUANTES, BOTAS, OVEROL DE DOS PIEZAS, GAFAS DE PROTECCIÓN, Y RESPIRADOR), Y PARA INGRESAR AL ÁREA TRATADA EN LAS PRIMERAS 72 HORAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.

Información para el médico: El envenenamiento con metomil produce efectos asociados con la actividad de la anticolinesterasa, como: debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, malestar en el pecho, constricción de la pupila, sudoración, pulso débil y temblores de los músculos. Antídoto: Tratamiento: Utilice sulfato de atropina para el tratamiento. Administre dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg, vía intravenosa, cada 10 a 30 minutos hasta alcanzar una atropinización completa. Mantenga la atropinización hasta que el paciente se recupere. La respiración artificial u oxígeno pueden ser necesarios. No permita la exposición a inhibidores de la anticolinesterasa hasta asegurar la recuperación. No utilice 2-PAM para exposiciones con **Lannate® 40 SP** únicamente. Sin embargo, para exposiciones combinadas de **Lannate® 40 SP** con insecticidas organofosforados, el 2-PAM puede ser utilizado como suplemento al tratamiento con sulfato de atropina, descrito anteriormente. No utilice morfina.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-13040
CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0801-10200

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RESPONSABILIDAD CIVIL: **"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."**