

# Elite®

80 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

#### COMPOSICIÓN

Fipronil.....	400 g/kg
Imidacloprid.....	400 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1341 - SENASA



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD

**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto 304, Urb. Santa Patricia  
II Etapa La Molina. Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

**Fabricado y Formulado por:**  
**POINT AGRO-CHINA LTD.**  
Wan Shi Town,  
Yixing, Jiangsu; 214217 China  
Tel (86-510) 8785 10018

CONTENIDO NETO: 250 g  
Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIONES:

- El producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Moderado irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas de espaldas de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIONES:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**ELITE 80 WG** es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto.

**ELITE 80 WG** afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte. Por su efecto sistémico controla *Hydrellia wirthi* en arroz y *Prodiplotis longifolia* en Pimiento y espárrago.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenilpirazole (Fipronil) + Neonicotinoide (Imidacloprid)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestrele la etiqueta o la hoja de información adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar abierto, alejado de la zona tratada, si es necesario, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar de beber nada si la persona está inconsciente.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 328 7700  
ESSALUD: 411 8000 opción 4; CISPROQUIM:0800 50847

Las aplicaciones de **ELITE 80 WG** se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

**ELITE 80 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

**ELITE 80 WG** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase/VL depositado en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Tóxico para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Arándano	"Mosca blanca"	<i>Aleurodicus juleikae</i>	-	0.15	21	0.005* / 0.05**
Arroz	"Mosca minadora del arroz"	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.1	0.1	40	0.005* / 1.5**
Cebolla	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	15	0.02* / 0.1**
Espárrago	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0.1 - 0.15	0.3 - 0.45	21	0.005* / 0.05**
Pimiento	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplotis longifolia</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	21	0.005* / 1.0**

PC: Periodo de Carencia L.M.R: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). Fipronil\*, Imidacloprid\*\*.

