

Elite[®]
80 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Fipronil.....400 g/kg
Imidacloprid.....400 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 1341 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304, Urb.Santa Patricia
II Etapa La Molina. Lima - Perú
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

Fabricado y Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD.
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu; 214217 China
Tel (86-510) 8785 10018

CONTENIDO NETO: 1 kg
Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIONES:

- El producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Moderado irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenilpirazole (Fipronil) + Neonicotinoide (Imidacloprid)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestrele la etiqueta o la hoja de información adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar abierto, alejado de la zona tratada, si es necesario, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar de beber nada si la persona esta inconsciente.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4; CISPROMQUIM:0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Toxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Arándano	“Mosca blanca”	<i>Aleurodicus juleikae</i>	-	0.15	21	0.005* /0.05**
	“Mosca minadora del arroz”	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.1	0.1	40	0.005* /1.5**
Cebolla	“Thrips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	15	0.02* / 0.1**
Espárrago	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.1 - 0.15	0.3 - 0.45	21	0.005* /0.05**
Pimiento	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	21	0.005* / 1.0**

PC: Periodo de Carenia

L.M.R: Limite Máximo de Residuos (partes por millón).

Fipronil*, Imidacloprid**.

