

Elite®

80 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Fipronil.....	400 g/kg
Imidacloprid.....	400 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 1341 - SENASA



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304, Urb.Santa Patricia
II Etapa La Molina. Lima - Perú
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD.
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu; 214217 China
Tel (86-510) 8785 10018

CONTENIDO NETO: 1 kg
Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIONES:

- El producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Moderado irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenilpirazole (Fipronil) + Neonicotinoide (Imidacloprid)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestrele la etiqueta o la hoja de información adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Llamar al médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar abierto, alejado de la zona tratada, si es necesario, llamar al médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No dar de beber nada si la persona esta inconsciente.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4; CISPROMIM:0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y depósito en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ELITE 80 WG es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto.

ELITE 80 WG afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte. Por su efecto sistémico controla *Hydrellia wirthi* en arroz y *Prodiplosis longifila* en Pimiento y espárrago.

Las aplicaciones de **ELITE 80 WG** se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En cebolla realizar máximo una aplicación por campaña, una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

ELITE 80 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

ELITE 80 WG no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Arándano	“Mosca blanca”	<i>Aleurodicus juleikae</i>	-	0.15	3	0.005*/0.05**
Arroz	“Mosca minadora del arroz”	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.1	0.1	40	0.005* /1.5**
Cebolla	“Thrips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	14	0.02* / 0.1**
Espárrago	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.1 - 0.15	0.3 - 0.45	21	0.005*/0.05**
Pimiento	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.2	0.3 - 0.4	21	0.005* / 1.0**

PC: Periodo de Carenia

L.M.R: Limite Máximo de Residuos (partes por millón).

Fipronil*, Imidacloprid**.

