

15 cm

2.2 cm

28.5 cm

ENVASE: COEX
Etiqueta 1Litro

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente. No ingerir.
- Causa irritación moderada en los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito a menos que así lo indique el médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CICOTOX: 08001-3040

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ SAC: 452-4512

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación de al menos 10 m.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

TRINITY

300 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Tebuconazole 225 g/L
Triadimenol 75 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.

Importado y Distribuido por:

BIOQUÍMICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.C.



Av. Manco Cápac N° 847 Carmen de la Legua
Reynoso - Callao
Teléfono: 452-4512

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 20 L

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRINITY 300 EC es un fungicida sistémico con acción curativa y preventiva. Es absorbido por las hojas y posee traslocación acropétala con un largo periodo residual.

TRINITY 300 EC se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o mantados sobre tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	0.4	14	0.05

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: TRINITY 300 EC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad y aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

No realizar mas de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicaciones de 15 días o más.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TRINITY 300 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: TRINITY 300 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



NOMBRE COMERCIAL
NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA
Banda toxicológica Pantone Yellow
C:0 M:0 Y:100 K:0