

22.6 cm

1 cm

0.5 cm

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No permitir el ingreso al área tratada de personas embarazadas, niños y personas en general ni animales domésticos.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico, comunicarse con un centro de emergencias toxicológicas o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediatamente, comunicarse con un centro de emergencias o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ó CROP BUSINESS SAC: 349-2669
CIPROSQUIM: 328-7398 Centro Nacional de Emergencia Essalud: 117
- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autirozado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



FALKO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin..... 250 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg PQUA N° - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por:
N° de Lote: NORCHEM JIANGSU CORPORATION
Contenido neto: 500 ml West Tower Fortune International Building
Fecha de Vencimiento: N° 359, Hongwu Road - Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FALKO es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control del "Tizón temprano", "Mancha del peral" y "Pyricularia" en los cultivos de papa, cebolla y arroz respectivamente.

FALKO se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7	0.1
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	0.01
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	5.0* 0.05**

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Limite máximo de residuo *Azoxystrobin **Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.
Para el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.
Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: FALKO es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.
FITOTOXICIDAD: FALKO no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



NOMBRE COMERCIAL

NEGRO

C:0 M:0 Y:0 K:100

12 cm

1.8 cm