

CONTOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Imidacloprid700 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 1357- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo 401, Oficina 610.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (511) 713-9960
rainbowchem@rainbowchem.com
www.rainbowchem.com



FORMULADO POR:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center,
Shunhua Road 750 #, Jinan, Shandong
China 250101. Tel: 86-531-88875230
Fax: 86-531-88875232

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Solandina Perú SAC.
Av. Alfredo Benavides N° 2975 Of.902
Urb. A. Von Humboldt , Miraflores - Lima - Perú.
Teléfono :+51960241693



Contenido Neto: 30 g

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas"

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

- En caso de ingestión: no inducir al vómito, mantener al paciente en un lugar protegido de la luz. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua durante 15 minutos.

- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.

- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a:

ESSALUD: 01-411-8000 (Opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50-847.

CICOTOX : 0800-1-3040

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONTOR es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión con efecto inhibidor de la alimentación del insecto. Después de su aplicación es incorporado rápidamente por la planta y presenta distribución acropétala. Se puede aplicar vía foliar o en drench.

Preparación de la mezcla:

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

-Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

-La absorción de **CONTOR** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.08-0.10	7	0.05

