

**“ LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Evitar respirar el polvo o inhalar, es ligeramente peligroso.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto, en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar, conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar, ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.
- Antídoto: Sulfato de Atropina.
- Administrar 2.1 mg de Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
- En niños menores (13 años) administrar 0.05 mg/kg sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LÍNEA: 080-10200
FITOCORP: 6522183

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos; así como plantas acuáticas, subacuáticas y plantas terrestres no objetivo.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligrosos para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GUSAMILO 90 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
GUSAMILO 90 SP controla las plagas indicadas en el cuadro de uso.
GUSAMILO 90 SP puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, patihuélas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **GUSAMILO 90 SP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga. Toda aplicación, debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. En los cultivos de espárrago, tomate y pimiento se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En el cultivo de maíz se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

GUSAMILO 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiquetas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC* (Días)	LMR* (p.pm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	"Barrenador de brotes"	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	0.4	1	2.0
Tomate	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.2	0.4	2	0.5
Maíz	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.3	0.5-0.6	14	0.02
Pimiento	"Polilla (gusano del fruto)"	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.2	0.4	3	0.02

*P.C. Período de Carencia.

*L.M.R: Límite Máximo de Residuos.



GUSAMILO 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

Composición química:

Methomyl.....900 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular del Registro:
FITOCORP SAC

Calle Los Tejedores 187. Vulcano. Ate
Teléfono: 016522182

Formulador:

BETA CHEMICAL LTD
Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road, Haidian District, Beijing, China

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto:

Lote Nro.

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

