21.0 cm

0.7 cm

0.5 cm

7.7 cm

1.20 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo químico: Organofosforado**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CIPROSQUIM: 0800-5-0847 **CROP BUSINESS SAC: 349-2669**
CICOTOX: 08001-3040 **ESSALUD: 117**

- Nota al médico : Antídoto: Sulfato de atropina

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficiosos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

SUMMUS 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Dimethoate ..... 400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°1363 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC
Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C

Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
Lote N°:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
Nro.23. Lane 5398, Shenzhuan Road
Song Jiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
SUMMUS 400 EC es un insecticida organofosforado que actúa por contacto e ingestión.

SUMMUS 400 EC actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis nerviosa produciendo parálisis y muerte de los insectos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.25	1.25	21	0.02
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.2	0.8	7	0.02

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.: Límites máximos de residuos**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: SUMMUS 400 EC debe ser aplicado ante la presencia de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
FITOTOXICIDAD: SUMMUS 400 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.