

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
Octubre 2018
ML

PANTONE YELLOW C

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto címbrese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacene el producto en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión: no debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua de 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel: remover inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua de 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, entonces dar respiración artificial.
- Nota al médico:
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD 0800-109200 (gratuito)
CICOTOL: 0-800-1-3040 (gratuito) ó 326-7398



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilicelo triturándolo o perforándolo y deséchelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Alimento peligroso para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 20 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

REGLAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA NEMATOCIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato..... 20.0 g/L
Abamectina..... 20.0 g/L
Aditivos..... csp l l

Reg. PQUA Nº 1371 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Of. 401, La Molina, Lima - Perú.

Teléfonos: (511) 4193000

E-mail: info@corpmontana.com



Contenido Neto: 1L

Lote Nº:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
• REGLAN es un insecticida transaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción similares pero con diferentes características fisicoquímicas lo que le permite otorgar un mejor control sobre los insectos presentes en el cultivo. Emamectin benzoato y Abamectina pertenecen al grupo químico de las Avermectinas y actúan bloqueando la actividad eléctrica a nivel de las neuronas, lo que provoca la parálisis y muerte del insecto.

• REGLAN puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Se recomienda aplicar la dosis recomendada en un volumen de agua que permita formar una fina neblina. Hacer una premezcla del producto en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verterla a la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L) [L/Ha]	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Quinua	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.20 - 0.25	N/A	(Emamectin benzoato) 0.01 (Abamectina)
Aveja	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25 - 0.3	7	(Emamectin benzoato) 0.01 (Abamectina)
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Nematolyda maculosa</i>	0.2 - 0.3	30	(Emamectin benzoato) 0.01 (Abamectina)
Vid	Nematodo del rudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	3 - 5	(Emamectin benzoato) 0.03 (Abamectina)
Piniento	Nematodo del rudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0 - 1.25	3	(Emamectin benzoato) 0.03 (Abamectina)

PC: Período de curación (días) / LMR: Límite máximo de residuos en ppm (partes por millón) / N/A: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar el producto en la primera evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días y luego rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- En caso de aplicación en áreas de cultivo de alta productividad, se debe aplicar en la zona de la planta.
- En vid y pinos: Aplicar al suelo vía directo o al sistema de riego por goteo, dirigido a la base de las plantas en la zona de bulbo húmedo donde se desarrollan las raíces.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

REGLAN es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Evitar ser mezclado con compuestos altamente reactivos como ácidos y bases, fuertes oxidantes, etc. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

REGLAN no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.