

MENTOR®

750 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin	250 g / Kg
Tebuconazole	500 g / Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1263 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

JEMOAGRO S.A.C.

Av. Camino Real N° S/N, Panamericana Norte Km. 557
Sector Alto Moche, Trujillo - Perú
ventas@jemoagro.com

FORMULADO POR:

Zhejiang Bosst Cropscience Chemical Co., Ltd.

No.1, Fangjiadai Road, Haiyan Economic Development Zone,
Zhejiang Province, China. Tlf.: +86-573-86972323/86972233

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

JEMOAGRO S.A.C.

Contenido Neto: **250 g**



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico, no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurina + triazol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- MENTOR 750 WG es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, azoxystrobin (sistémico y translaminar) y tebuconazole (sistémico y de amplio espectro), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar MENTOR 750 WG principalmente para el control de manchas foliares.
- MENTOR 750 WG se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecomás, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

MENTOR 750 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, sin embargo, es recomendable realizar una previa prueba de compatibilidad. No mezclar con agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		*PC (días)	**LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/cilindro	Kg/ha		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	--	0.30	14	0.01 Azoxystrobin 0.03 Tebuconazole
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.20	--	7	0.1 Azoxystrobin 0.05 Tebuconazole
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.10	0.30	30	0.30 Azoxystrobin 0.31 Tebuconazole

**LMR: Límite Máximo de Residuos; *PC: Periodo de Carencia

