

SET. 2015
ML

PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es dañino, tóxico y peligroso.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, lávese las manos y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para regresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto en armarios secos, frescos y bien ventilados.
- Advertir a los niños que han consumido juguetes de estos últimos para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Aclor, Tetratónicos - Avenmedina.
- En caso de contacto con la piel y lavado con agua abundante. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicitar atención médica inmediata.
- No administrar ningún tipo de medicamento.
- Nota: Trasladar al paciente al médico especialista. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 117
CICLOTIX: 0-800-1-3040 (gratuito) o 328-7386

TOPADOR PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spirodolifen 180 g/L
Avenmedin 25 g/L
Aditivos CSF 1 L

Reg. PQUA N° 1373 - SENASA

Formulado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6270, Oficina 401,
La Molina, Lima - Perú
Servicio de atención al cliente: (511) 419 3030
Info@copymontana.com
www.copymontana.com

Contenido Neto: 250 mL

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:



NO CORROSIVO

¡ INFLAMABLE !

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TOPADOR PLUS es un producto químico que debe ser aplicado por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arácnidos presentes en el cultivo. Spirodolifen pertenece al grupo químico de los Aclor, Tetratónicos y actúa reduciendo la síntesis de lípidos. Por otro lado, Avenmedina pertenece al grupo químico de las Avenmedinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los axones de los insectos y aumentando el monto de acción.

- TOPADOR PLUS puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (movil), equipos calibrados antes de ser utilizados, por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (dias)	LMR (g/ml)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarino	Ácaro rojo	Panonychus citi	0.04 - 0.06	21	Spirodolifen: 0.4 Avenmedina: 0.01
Papa	Ácaro rojo	Oligonychus javata	0.04 - 0.06	21	Spirodolifen: 1.0 Avenmedina: 0.01
Vid	Ácaro rojo	Tetranychus urticae	0.04 - 0.06	28	Spirodolifen: 2.0 Avenmedina: 0.01

PC: Días de Cuarenta
LMR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

HOJA INFORMATIVA_TIRA 24 CM X 6 CM

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TOPADOR PLUS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

MONTANA



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

- Grupo químico: Ácidos Trinitroicos (Spinosadifenil) - Avermectina (Avermectina)
- Registro PQM Nº 1273 - SENASA
- Nombre común: Spinosadifenil (180 g/L) + Avermectina (15 g/L)
- Nombre químico: 3-(2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxopropil-5-oxo-2-en-4-yl 2,2-dimethylbutanoate (Spinosadifenil), mezcla de > 80% de avermectina B1a: (5-O-desmetil avermectina A1a) y < 20% avermectina B1b: (5-O-desmetil-15-desmetil) (Avermectina)
- Fórmula empírica: C₂₄H₃₂Cl₂O₆ (Spinosadifenil), C₂₈H₄₄O₆ (Avermectina)
- Peso molecular: 413.32 g/mol (Spinosadifenil), 473.3 g/mol (Avermectina B1a) + 859.1 g/mol (Avermectina B1b)
- Fórmula estructural:



HOJA INFORMATIVA_RETIRA 24 CM X 6 CM

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - Aplicar de preferencia en las mañanas, siguiendo la dirección del viento.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.
- ### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- TOPADOR PLUS es un insecticida transaminar que actúa por contacto e ingestión y está compuesto por dos ingredientes activos con modos de acción complementarios: a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arácnidos presentes en el cultivo, Spinosadifenil pertenece al grupo químico de los Ácidos Trinitroicos y actúa bloqueando la síntesis de lipídios. Por otro lado la Avermectina pertenece al grupo químico de los Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro, lo que limita el efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico provocando la parálisis y muerte del insecto o acaro.
 - TOPADOR PLUS puede ser aplicado con pulverizadores manuales de columna (mochilas, equipos estacionarios o accionados por tractores). Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar

bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

CONTENIDO DE PRODUCTO POR ENVASE

CULTIVO	TAMPA		DOSIS (g/L)	PC (litros)	LMT (litros)
	Reserva	Operación			
Mandarino	Árbol 10/1	Troncos 10/1	0.34-0.50	21	Spinosadifenil 180 g/L + Avermectina 15 g/L
Papa	Árbol 10/1	Operación 10/1	0.34-0.50	21	Spinosadifenil 180 g/L + Avermectina 15 g/L
Nal	Árbol 10/1	Troncos 10/1	0.34-0.50	21	Spinosadifenil 180 g/L + Avermectina 15 g/L

IC: Oficina de Control de Alimentos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Se recomienda realizar una aplicación por campaña y luego rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
 - Ingresar al área tratado en los primeros 24 horas después de la aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Almacene el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- ### PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Ácidos Trinitroicos + Avermectina.
 - En caso de contacto cutáneo: lávela la ropa y cubado contaminado. Lave inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, durante 15 minutos como mínimo.
 - En caso de ingestión: Lave las vías con abundante agua.
 - En caso de inhalación: No inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de inhalación: Trásfer al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario y solicitar atención médica inmediata.
 - Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
 - Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 117
CICOTEX: 0-800-1-3040 (gratuito) o 328-7358



- ### PERIODO DE REINGRESO
- No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.
- ### COMPATIBILIDAD
- TOPADOR PLUS es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea utilizar.
- ### BIOTOXICIDAD
- TOPADOR PLUS no es fitotóxico usado a las dosis y en las calidades recomendadas en la presente etiqueta.
- ### RESPONSABILIDAD CIVIL
- El titular de registro garantiza que las características técnicas del producto contenido en este envase corresponden a las unidades en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

