

Etiq. Sticker STAR 2 Litros Tira

20/07/15 TIRA

Star

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN :

Ácido S-abcísico 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PBUA N° 354 – SENASA

Titular de Registro, Importador, Distribuidor:

FARMAGRO S.A

Av. Alfredo Mendiola 6068.Los Olivos – Lima

Central: (051-1) 614-1500



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:

ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

Industrial Area, Xinshi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang

CHINA

N° de Lote:

Contenido Neto: **2L**

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Etiq. Sticker STAR 2 Litros Retira

20/07/15 TIRA

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

- Nota al médico

- DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg
- DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg
- Antídoto: No existe antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **STAR** es un regulador de crecimiento vegetal que contiene Ácido S-abcísico (ABA) aplicado para promover la coloración uniforme de bayas de vid mediante el incremento de la síntesis de antocianinas que se concentran en la epidermis de la baya de las variedades coloreadas de vid.

- **Sistemas de preparación y aplicación:** **STAR** se emplea en mezcla con agua. Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 5.5 a 6.5 para una mejor acción del producto. Evitar aplicar con viento excesivo que provoque deriva y disminuya el tiempo de absorción del producto. Como se trata de un producto que actúa por contacto se debe asegurar un buen cubrimiento de la planta. Las soluciones deben utilizarse el mismo día de su preparación.

“Consulte con un ingeniero agrónomo”

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (ml/cil 200L)	U.A.C. (Días)	LMR (ppm)
Vid	A partir del inicio de maduración (pinta) indicado por ablandamiento y/o coloración de frutos.	700 - 800	*	*

U.A.C.: Última aplicación antes de la cosecha en días LMR: Límites máximos de residuos*
* No requiere por ser un producto Biológico

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para optimizar la efectividad de **STAR** se recomienda aplicar directamente a racimos desde inicio de maduración (pinta).

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar el producto solo.

FITOTOXICIDAD

No se observa efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

