

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es letal por ingestión, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Spinosinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No lleve antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 411-800 opción 4 CROP BUSINESS SAC: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilicelo triturándolo o perforándolo y deséchelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y arácnidos benéficos
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.

MAJESTIC

120 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Spinosad 120 g/L
Aditivos csp 11

Reg. POUA N° 1385 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Magareño N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Elapa - La Molina
Teléfono 349-2669

Formulado por
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 21, Lina 3350, Shenzhen Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 ml

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MAJESTIC 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de *Spodoptera frugiperda* y *Heliothis virescens*.

MAJESTIC 120 SC se prepara haciendo una premezcla en un cantidad reducida de agua, luego agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha	(dise)	(ppm)
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	0.15	7	1.0
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1	0.2	1	0.3

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. En ambos cultivos, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con un intervalo de aplicación de 14 días

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas.

20.0 cm

8.00 cm

1.2 cm

INDICACIONES DE USO Y MANEJO:
MAJESTIC 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de *Spodoptera frugiperda* y *Heliothis virescens*.
MAJESTIC 120 SC se prepara haciendo una mezcla en una cantidad reducida de agua. Luego agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/200 L	L/HA	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	PLAGA		Dosis
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.075	0.15	7	1.0			
	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.1	0.2	1	0.3			
Pimiento									

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
 Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. En ambos cultivos, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con intervalo de aplicación de 14 días.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.
PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidantes. La mezcla con otros productos debe ser previamente probada bajo condiciones de campo.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
 MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

Formulado por:
 SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
 N° 23, Lane 539B, Shenzhuan Road
 Songyang District, Shanghai
 CHINA
 Teléfono: 349-2669
 Av. Maigang N° 580 Dpto. 301
 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Habana

Importado y Distribuido por



de los insectos tratados.
 MAJESTIC 120 SC tiene efectos sutiles sobre la capacidad de reproducción de la plaga, afectando la fecundidad y la fertilidad de los adultos y la dinámica poblacional.
Mecanismo de acción: MAJESTIC 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de la plaga.
Presentaciones: 250 ml, 1 litro y 200 litros, en envases FEAD.
Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:

Densidad: 1.03 - 1.10 g/ml
 pH: 6.5 - 8.5
 Color: Blanco a gris
 Estado físico: Líquido

Propiedades físicas y químicas:

Grupo químico: Spinosinas
 Peso molecular: 732.0 g/mol (Spinosin A), 746.0 g/mol (Spinosin D)
 Fórmula empírica: $C_{21}H_{26}NO_6$ (Spinosin A), $C_{21}H_{26}NO_6$ (Spinosin D)

Nombre químico (IUPAC): heptadecanoato de 1-(5S,6S)-2,3-dihidro-6-metil-5H-benzofuro[3,2-b]pirano-5-carboxilato (5S,6S)-
 Nombre químico (IUPAC): heptadecanoato de 1-(5S,6S)-2,3-dihidro-6-metil-5H-benzofuro[3,2-b]pirano-5-carboxilato (5S,6S)-

Reg. P.A. N° 1385 - SENASA
 Aditivos: 120 g/L
 Suspensión concentrada - SC

COMPOSICIÓN

INSECTICIDA - AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

MAJESTIC 120 SC

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Spinosinas
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. • Lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 En caso de contacto con los ojos: lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, retirar el afectado de la zona tratada. • Consulte al médico.
 En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
 En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.
 No tiene efecto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040
 ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 411-800 opción 4
 CROP BUSINESS SAC: 349-2669



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:
 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y ventile la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice tirándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 Depositar los envases inutilizados en zonas alejadas de fuentes de agua y de casas habitación.
 No disponer con residuos municipales.
 Llevar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluir la labor de campo. Utilizar una solución alcalina para neutralizar la acción del plaguicida.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
 No aplicar en época de floración del cultivo.
 Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
 Peligroso para organismos acuáticos.
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrecargas del producto.
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

