

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la suspensión.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Spinosad.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: láveselos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retire al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retire al afectado de la zona, trasládalo a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
- En caso de ingestión: no provocar vomitos, pero no entorpecer si es de forma espontánea, no dar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD EN LINEA: 0800 - 10200 411-800 opción 4 CROP BUSINESS SAC: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Toxico para abejas y otros insectos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MAJESTIC 120 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Spinosad 120 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1385 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Margarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Formulado por:
SHANGHAI TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MAJESTIC 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de *Spodoptera frugiperda* y *Heliothis virescens*.

MAJESTIC 120 SC se prepara haciendo una premezcla en una cantidad reducida de agua, luego agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/2000 L	L / Ha		
Meliz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	0.15	7	10
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.10	0.2	1	0.3

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuo (ppm: partes por millón)

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique.

En ambos cultivos, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con intervalo de aplicación de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.