

160.00 mm

EVISPECT-[®]S

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Composición:	
Thiocyclam-hydrogenoxalato.....	500 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. /kg

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú



Arysta
LifeScience
Innovation. Agility. Results.

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf 710-4068

®Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Análogo de la nerestoxina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávuelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lávelase con abundante agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos: lánzales con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel: lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental: suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antídoto:** Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- En caso de tirarme recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT® es un insecticida de una nueva estructura química, relacionada con las neurotoxinas (autorregula natural presente en ciertos artrópodos marinos; Luminibacter spp.), con acción estomacal y sistémica. La local ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Diluir la dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar bien esta pre-mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua a usar.

Consulte con un ingegnere agronomo

CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	FLAGA		DOSES		PC (días)	LMR (ppm)
			kg/ha	%	kg/día	%		
Ají, Pimiento	Guano pericoma	<i>Heliconia plicata</i>	0.30-0.40	-----	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Ascofaba	Guano delibador	<i>Lesqueria podocarpa</i>	0.30-0.40	-----	0.15-0.20	-----	N.D.	3
Algodón	Pericoma de la hoja	<i>Baccharis humilis</i>	0.5	-----	-----	-----	15	0.02
	Guano mayor de la hoja	<i>Albarrina capibata</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cebolla	Guano menor de la hoja	<i>Artemisa lucida</i>	-----	-----	-----	-----	N.D.	3
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Epilragro	Guano delibador	<i>Heliconia plicata</i>	0.20-0.40	-----	0.10-0.20	-----	N.D.	3
	Guano copiloro	<i>Sporoglyphis fragrans</i>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Granado	Guano delibador	<i>Coplinia trifida</i>	-----	-----	-----	-----	N.D.	3
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	-----	0.1	0.05	-----	-----
Palo	Thrips del pelo	<i>Thrips tabaci</i>	-----	-----	0.15-0.20	0.075-0.1	14	3
	Polia	<i>Tuta absoluta</i>	5.73	-----	0.1	0.05	N.D.	3
Tomate	Mosca blanca	<i>Heliothrips saccharifodalis</i>	-----	-----	0.35	-----	15	3
	Thrips	<i>Bemisia tabaci</i>	3.25-4.40	-----	0.15-0.20	-----	14	3
Vid	Polia de la papa	<i>Thrips tabaci</i>	-----	-----	0.1	0.05	N.D.	0.01
	Thrips	<i>Phlorimome operculata</i>	3.25-4.30	-----	-----	-----	N.D.	0.01
Papa	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-----	-----	-----	-----	N.D.	0.01

UR- Limite máxima de residuo

P.C.: Período de Carença

N.D.: No determinación

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT® debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodonero deberá efectuarse con estadíos larvarios 1 y 2, y cuando al 10% de las plantas estén afectadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes afectados y/o con estadíos larvarios 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT® **es compatible** con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT Si la aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.



ET PQUA Nº109-96-AG-SENASAV004-25