

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:
Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro: ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Peru



Formulador: NIPPON KAYAKU Co., Ltd.
1-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan



Importador y Distribuidor: SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf. 7710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 25 kg
Fecha de vencimiento:

©Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

190.00 mm

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas.
- No amestazar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Análogo de la neotetona
- En caso de ingestión: Beba abundante agua o leche y llévela al médico inmediatamente o llévela al servicio de urgencias.
- En caso de contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental suministrar carbón medicinal.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysatine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CIPROQUIM: 080-459-847 Arysta LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Los envases vacíos deben ser lavados y desinfectados antes de ser reutilizados. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entregue o deséchela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No permita que los animales beban o coman de la zona de aplicación o adyacentes al producto.
- No contaminar las fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas naturales presentes en ciertos anélidos marinos: Lumbricoides spp., con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y Diurra a dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta premezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LWR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	%		
Ajo, Pimiento	Guano perforador	Heliothis virescens	0.30-3.40	----	N.D.	3
	Morosa minadora	Liriopeza meibomiana	0.30-3.40	----	N.D.	3
	Guano delabrador	Heliothis virescens	0.30-3.40	----	N.D.	3
	Perforador de la hoja	Baculatrix thurberiella	0.5	----	15	0.02
Cebolla	Guano mayor de la hoja	Albarmia argillacea	----	----	----	----
	Guano menor de la hoja	Aronia tenax	----	----	----	----
Espirago	Guano delabrador	Heliothis virescens	0.20-3.40	0.05	N.D.	3
	Guano copelero	Stenobothrus frugiperda	----	0.05	N.D.	3
	Guano delabrador	Capitaneia torbida	----	0.1	N.D.	3
	Thrips	Thrips tabaci	----	0.15-0.20	0.075-0.1	14
Granado	Thrips	Thrips tabaci	----	0.1	0.05	3
	Thrips del pallo	Thrips tabaci	----	0.1	0.05	3
Pato	Polilla	Tuta absoluta	0.20	0.35	15	3
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.30-3.40	0.15-0.20	14	3
Tomate	Thrips	Thrips tabaci	0.1	0.05	N.D.	0.01
	Polilla de la papa	Phthorinia operculata	0.60	----	N.D.	0.01
Papa	Thrips	Thrips tabaci	0.20-3.30	----	N.D.	0.01

LWR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cereza

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe ser declarada con estadísticas larvales 1 y 2, y cuando el 10% de las plantas estén dañadas. En el cultivo de tomate aplicar con 10% de bores infestados y/o con estadísticas larvales 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos. RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/004-25