

160.00 mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

EVISECT®-S

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Thiocyclam-hydrogenoxalato.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. N° 109-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracaras N° 2226 Urb. Oyague
Jesus Maria - Lima - Perú



Formulador:

Syngenta Crop Protection AG
Suiza

Importador y Distribuidor:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria - Lima - Perú
Telf: 7710-4068



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 25 kg
Fecha de vencimiento:

©Es marca registrada de Nippon Kayaku Co., Ltd.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

190.00 mm

160.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto címbrese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el empaqueo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evite el contacto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: Lavar la boca con abundante agua y beber abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental: Lavar la boca con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Antídoto: Aplicar una inyección intravenosa de 1-cysteine a la dosis de 12.5 a 25 mg por kilogramo de peso.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 105 CISPPOQUIM: 080-050-347 Ayuda LifeScience Perú S.A.C.: (01) 221-5729

CONSEJOS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya sido etiquetado debe reutilizarse. Después de usar el contenido inclúyalo a fondo o bórralo. Entregue a disposición en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con las resacas de aplicación o sobantes del producto.
- No utilizar el equipo de aplicación en días de lluvia.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EVISECT®-S es un insecticida de una nueva estructura química relacionada con las neurotoxinas (sustancia natural presente en ciertos anélidos marinos: miraflores spp.), con acción de contacto y estomacal, con efecto de penetración y translocación dentro del tejido de la hoja, lo cual ayuda a la acción estomacal. Controla insectos masticadores y minadores.

Disuirla a dosis indicada en 5 litros de agua aproximadamente, agitar y verter esta pre mezcla en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	Nombre común	PLAGA	DOSIS			PC (días)	LWR (ppm)
			Nombre científico	Hecha	Kg/ha		
Alfalfa	Guano perforador	Heliothis virescens		0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Mosca minadora	Liomyza huachobensis		0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
	Guano defoliador	Heliothis virescens		0.30-0.40	0.15-0.20	N.D.	3
Algodón	Perforador de la hoja	Bucculatrix thurberiella		0.5	---	15	0.02
	Guano mayor de la hoja	Alseia argillacea		---	---	---	---
	Guano menor de la hoja	Alseia argillacea		---	---	---	---
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci		---	0.1	0.05	3
	Guano defoliador	Heliothis virescens		0.25-0.40	0.10-0.20	N.D.	3
	Guano copilero	Spodoptera frugiperda		---	---	---	---
Espirago	Guano defoliador	Copaxa turbita		---	---	---	---
	Thrips	Thrips tabaci		---	0.1	0.05	3
	Thrips del pallo	Thrips tabaci		---	0.15-0.20	0.05-0.1	14
Grano	Polilla	Heliothis virescens		---	---	---	---
	Thrips del pallo	Thrips tabaci		---	0.1	0.05	3
	Polilla	Heliothis virescens		---	---	---	---
Tomate	Mosca blanca	Bemisia tabaci		0.30-0.40	0.15-0.20	15	3
	Thrips	Thrips tabaci		---	0.1	0.05	3
	Polilla de la papa	Plutella maculipennis		6.00	---	N.D.	0.01
Papa	Thrips	Thrips tabaci		0.25-0.30	---	N.D.	0.01
	Thrips	Thrips tabaci		---	---	N.D.	0.01
	Thrips	Thrips tabaci		---	---	N.D.	0.01

LWR: Límite máximo de residuo

PC: Período de Cereza

N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para lograr mejores resultados tanto biológicos como económicos EVISECT®-S debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros daños en el cultivo. La aplicación en el cultivo de algodón debe efectuarse con estadíos larvales 1 y 2 y/o cuando el 10% de las plantas estén afectadas.

En el cultivo de tomate aplicar con 10% de brotes afectados y/o con estadíos larvales 1 y 2.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar al área tratada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: EVISECT®-S es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de dudarse recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: EVISECT®-S La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ET POLA N°109-96-AG-SENASA/004-25