



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

250 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIBLE - EC

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole..... 250 g/L.
Aditivos..... c.s.p. 1 L.

PQA N° 1386-SENASA

Titular del Registro:
Pedro Pablo Martinez Moreno
RUC: 10476547763
Jr. Loma de las Lilas 147 - Surco.

Formulado por: MAC GmbH
Alte Landstrasse 15 D-88138
Sigmarszell Alemania
E-Mail: info@macgmbh.de

Importado y distribuido por:
Perú Productos Agrícolas S.A.C.
RUC: 20530897983
Av. Nicolas de Arriola # 2374, San
Luis, Lima.
Tel: 01 5470638



F. de Formulación:
N° de lote:
Cont. Neto: 250 mL.
F. de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos Químicos : Triazoles
-En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado.
-En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos.
-En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOMAC es absorbido por las hojas, actúa en los hongos patógenos por interferencia de la biosíntesis del ergosterol, dando lugar al crecimiento anormal y eventual muerte del hongo.
Aplicar preventivamente cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 1 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de marcada reacción alcalina, como azufres, aceites y otras inorgánicas.

FITOTOXICIDAD

DINOMAC es un producto quelatado, por lo tanto no es fitotóxico pero usado en dosis mayores a lo indicado puede causar fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Table with 5 columns: Cultivo, Nombre de Enfermedad (Nombre Común, Nombre Técnico), Dosis (L/Cil 200 l.), P.C (días), LMR. Row 1: Pimiento, Oidium, Leveillula taurica, 0.10, 7, 0.05

LMR = Limite Maximo de Residuos | PC = Periodo de Carencia

