

Medida bolsa trilaminada: 36 cm x 24 cm  
Medida del area de impresión: 27 cm x 18 cm  
Actualizada: SET.2015  
ML

# TIRA

PANTONE 293 C

# VITENE<sup>®</sup> 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN:**

Mancozeb ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 541 - SENASA

Titular de Registro:

**MONTANA S.A.**

**Fabricado y Formulado por:**



WILLOWOOD LIMITED  
17 Floor, Seaview Plaza,  
No.283- Shau Kei Wan Road,  
Hong Kong.

**Contenido neto: 25 Kg**

Lote N°:  
F. de Form.:  
F. de Exp.:

**Importado y Distribuido por:**

**MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210,  
Oficina 401, La Molina. Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117

CICOTOX: 0-800-1-3040

### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de la bolsa inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ninguna bolsa que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **VITENE 80 WP** es un fungicida de contacto (no sistémico) de amplio espectro de acción. Es recomendado para el control de *Alternaria*, *Pseudoperonospora*, *Helminthosporium*, *Botrytis*, *Septoria*, *Puccinia*, *Alternaria*, *Phytophthora*, *Cercospora*, *Mycosphaerella* y *Plasmopara*, entre otros, en diversos cultivos hortícolas, frutales y ornamentales.
- **VITENE 80 WP** actúa de forma preventiva inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinativo. Por tanto, evita el desarrollo del patógeno en los cultivos en que se recomienda.
- Se emplea mezclando con agua la dosis recomendada en el cuadro de usos. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.
- Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizadora, etc.) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (g/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	500	14	0.3
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	700	28	0.1
Mandarino	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600-750	15	10

PC: Período de carencia  
LMR: Límite Máximo de Residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean las propiedades para el desarrollo de la enfermedad.
- En papa iniciar las aplicaciones preventivamente. Antes que el patógeno se establezca.
- En el cultivo de papa se recomienda realizar una (01) aplicación de **VITENE 80 WP** por campaña como máximo por año.
- En mandarina se recomienda la aplicación de **VITENE 80 WP** en forma preventiva cuando el 50% de las inflorescencias muestren el estado de botón blanco, realizando aplicaciones con un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.

### PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**VITENE 80 WP** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

**VITENE 80 WP** no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

