

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

PQA N° 1389 - SENASA

Títular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima - Perú

**Formulador:**

Laoting Yoloo Bio-Technology Co.
Ltd No A-3 Tianjin Road, Laoting Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Importador y distribuidor:

AGRITOP S.A.C.
Av. Los Gorriónes 130 Urb. La Campiña
Chorrillos - Lima - Perú
Telf: 719-1717 / 719-1718

**Fecha de Formulación:**

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

®Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y mecanismo de acción: BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento traslaminar de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BINNAZ® 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol y el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	7* 7.3**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	10* 0.5**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5*
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	3* 6**
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3-0.4 ^a		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.20	0.3-0.4	7	3*
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	7	5* 4**
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-		

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite máximo de Residuos ^a En 1000L/ha

*Azoxystrobin
**Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar BINNAZ® 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad:
Para los cultivos de Papa y Cebolla, realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Arroz, Vid, Pimiento, Arándano, realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

