

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Evitar el contacto con la ropa.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y sellado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o torrajes.
- Evitar el uso de este producto en áreas donde se almacenen alimentos.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lavados con abundante agua durante 15-20 minutos. Continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferentemente boca a boca, con cuidado de no contaminarse.
- En caso de ingestión: no induzca el vomito. Lleve al paciente a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vomito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 105
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCENCE PERÚ S.A.C.: (01) 2215729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realice el lavado obligatorio del triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar el uso de este producto en áreas donde se almacenen alimentos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:
ARYSTA LIFESCENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyaque
Jesús María - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Formulador:
Kinfield Industry Co. Limited
Unit 905, Workinberg Commercial
Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:

DEMETER GROUP SAC
Calle Gamma Mz. B-7 L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetra.com.pe



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

©Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BINNAZ® 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de penetración. Irradinar de amplio espectro empleado en cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BINNAZ® 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos, azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor rango de control de enfermedades. El difenoconazole actúa inhibiendo la biotina, lo que impide que el hongo respire y muera. El azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción temprana sobre esporas) a través de la inhibición de la enzima citocromo b5. Ambos ingredientes actúan sinérgicamente para controlar las enfermedades. Modo de empleo: Antes de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Verter o echar la cantidad de BINNAZ® 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una solución estable y completar con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Volver a agitar y aplicar a la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Nombre común	Plaga	Nombre científico	Dosis	L/200 L	L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Papa	Tizon temprano	Alternaria solani	Alternaria solani	-	0.2	0.4	7	1*
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicatum	Stemphylium vesicatum	-	0.1	0.3	3	0.5*
Aroz	Piricularia	Piricularia oryzae	Piricularia oryzae	-	-	0.5	30	0.05*
Vid	Oidiois	Erysiphe necator	Erysiphe necator	-	-	0.5	21	2*
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	Botrytis cinerea	-	-	0.3-0.4*	3*	3*
Pimiento	Oidiois	Leveillula taurica	Leveillula taurica	-	0.15-0.20	0.3-0.4	7	0.8*
	Cabeza de davo	Alternaria tenuissima	Alternaria tenuissima	-	-	0.5	7	5*
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	Botrytis cinerea	-	0.2	-	7	4*
	Roya del arándano	Nothodermomyces vaccinii	Nothodermomyces vaccinii	-	-	0.5	-	-
Alcachofa	Oidiois	Leveillula taurica	Leveillula taurica	-	-	0.5	7	5*

P.C.: Período de Carenza L.M.R.: Límite máximo de Residuos
*En 1000 L/ha
**Azoxystrobin
***Difenoconazole
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar BINNAZ® 325 SC previa evaluación de la enfermedad y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/ha, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.
Para los cultivos de Aroz, Vid, Pimiento, Arándano y Alcachofa realizar hasta 1 aplicación por campaña/ha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BINNAZ® 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

