

275.00 mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No aplicar el producto en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, veterinarias.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenamiento de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suavemente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- Si el producto llega al estómago, llévelo al hospital inmediatamente. Lejos de síllos de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial preferentemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica.
- Si el paciente presenta síntomas de intoxicación, llévelo al hospital inmediatamente para su tratamiento.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
SAMU: 105
CISPROQUIM: 080-050-847

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.: (01) 221-5729

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- El envase debe lavarse al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Eliminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo alimenticio permeables.
- El producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BINNAZ® 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Azoxystrobin.....200 g/L
Difenoconazole.....125 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1389 - SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyaque
Jesús María - Lima - Perú
Telf: 719-4899



Formulador:
Laoing Yeloo Bio-Technology Co. Ltd
No A-3 Tianjin Road, Laoing Economic
Development Zone, Hebei Province 063600, China

Importador y Distribuidor:

DEMETER GROUP SAC
Calle Gamma Mz. B-7 L-9 Urb. Bocanegra
Callao - Lima - Perú
Telf: (51) 5754454
www.demetra.com.pe



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:

©Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo y momento de acción: BINNAZ 325 SC es un fungicida sistémico, de contacto y de movimiento. Se trata de un producto de amplio espectro empleado en los cultivos que se detallan en el cuadro de dosis. BinnaZ 325 SC es la combinación de dos ingredientes activos: azoxystrobin y difenoconazole, lo que le permite un mayor efecto fungicida. El azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial en los hongos (acción de contacto) y el difenoconazole bloquea la transferencia de electrones entre citocromos.

Modo de empleo: Antes de usar el producto se debe agitar bien el envase. Para la preparación deberá verse o echar la cantidad de BINNAZ 325 SC en un tanque con la mitad de agua a aplicar, agitar bien la mezcla hasta obtener una suspensión estable y completa con la mitad de agua restante, según dosis recomendada. Verter y aplicar la mezcla resultante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Nombre común	Plaga	Nombre científico	Dosis	L/200 L	L/Ha	P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani		0.2	0.4	7	1*	1*
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium		0.1	0.3	3	0.5*	0.5*
Ajoz	Piricularia	Piricularia oryzae		-	0.5	30	5*	5*
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator		-	0.5	21	2*	3**
	Podredumbre gris	Botrytis cinerea		-	0.3-0.4*			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica		0.15-0.20	0.3-0.4	7	3*	0.8**
Arándano	Podredumbre gris	Botrytis cinerea		-	0.5	7	5*	4**
	Roya del arándano	Nachidiomyces vaccinii		-	0.5			
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica		-	0.5	7	5*	1**

P.C.: Período de Carenza L.M.R.: Límite máximo de Residuos * En 1000 L/ha ** Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar BINNAZ 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Para los cultivos de Papa y Cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/ha, a un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones. Para los cultivos de Ajoz, Vid, Pimiento, Arándano y Alcachofa realizar hasta 1 aplicación por campaña/ha.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BINNAZ 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con bases fuertes y ácidos. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, a sea uso y manejo de acuerdo a las instrucciones de uso y precauciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.